

Тестовые вопросы ДПОП: «Первичная медико-санитарная помощь» (для медицинских сестер врача общей практики)

1. В структуре смертности в РФ в настоящее время ведущее место принадлежит:

- А) онкологическим заболеваниям;
- Б) болезням сердечно-сосудистой системы;
- В) травмам и отравлениям;
- Г) инфекционным заболеваниям.

2. Ведущая роль в системе оказания медицинской помощи женщинам принадлежит:

- А) женской консультации;
- Б) родильному дому;
- В) смотровому кабинету;
- Г) санаторию-профилакторию.

3. Одним из стационар замещающих учреждений организации медицинской помощи населению является:

- А) диагностический стационар;
- Б) поликлинический стационар;
- В) дневной стационар;
- Г) поликлиника.

4. Дневной стационар организуется для оказания медицинской помощи больным:

- А) состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и лечения;
- Б) состояние которых требует постоянного наблюдения со стороны врачей;
- В) состояние которых требует постоянного наблюдения со стороны медицинских сестер;
- Г) состояние которых не требует срочной госпитализации.

5. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - это:

- А) зона первого контакта населения с социальными службами;
- Б) зона первого контакта населения со службами здравоохранения;
- В) оказание населению первой медицинской помощи;
- Г) оказание населению специализированной медицинской помощи.

6. Самыми многочисленными учреждениями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), являются:

- А) амбулаторно-поликлинические учреждения;
- Б) больничные учреждения;
- В) учреждения родовспоможения;
- Г) учреждения скорой и неотложной медицинской помощи.

7. Приоритетным направлением развития здравоохранения в России в настоящее время считается развитие:

- А) стационарной помощи;
- Б) реабилитационной помощи;
- В) первичной медико-санитарной помощи;
- Г) первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

8. К числу самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений относятся:

- А) амбулатории и поликлиники;
- Б) дневные стационары;
- В) здравпункты и медпункты;
- Г) фельдшерско-акушерские пункты и травмпункты.

9. Основной документ медицинского страхования, дающий право гражданам на получение медицинской помощи:

- А) договор;
- Б) обязательство на получение медицинской помощи;
- В) страховой полис;
- Г) страховое свидетельство.

10. Первичная медико-санитарная помощь не включает

- А) Амбулаторно – поликлиническую помощь
- Б) Скорую и неотложную помощь
- В) Реабилитационную помощь
- Г) Стационарную помощь

11. Первичную медико-санитарную помощь оказывают

- А) стационары;
- Б) амбулаторно-поликлинические центры, офисы врача общей практики (семейного врача), женские консультации
- В) госпитали
- Г) санатории-профилактории

12. Что определяет максимальную доступность врача общей практики для населения

- А) продолжительный амбулаторный прием
- Б) универсальность знаний и практических навыков
- В) высокая техническая оснащенность
- Г) все вышеперечисленное

13. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, направленные на обезвреживание источника инфекции

- А) вакцинация
- Б) дезинфекция
- В) выявление и изоляция инфекционных больных и носителей
- Г) сбор и утилизация медицинских отходов

14. Наиболее вероятный путь передачи ИСМП в медицинских организациях

- А) контактно-бытовой
- Б) искусственный
- В) пищевой
- Г) воздушно-капельный

15. Комплекс мер по предупреждению инфицирования раны при медицинских манипуляциях – это

- А) асептика

- Б) антисептика
- В) заключительная дезинфекция
- Г) текущая дезинфекция

16. Для одноразового инструментария достаточно применить вид обработки

- А) предстерилизационная очистка
- Б) стерилизация
- В) дезинфекция
- Г) сразу утилизировать

17. Одноразовую систему после инфузионной терапии необходимо

- А) утилизировать сразу
- Б) погрузить в дезинфицирующий раствор, не разрезая
- В) сдать старшей медсестре
- Г) разрезать и погрузить в дезинфицирующий раствор

18. Работа с медицинскими отходами регламентируется

- А) Сан ПиН 2.1.7.2790-10
- Б) СанПиН 2.1.3.1375-03
- В) ФЗ №89 "Об отходах производства и потребления"
- Г) кадастром отходов производства и потребления РФ

19. Чума является инфекцией

- А) зоонозной, природно-очаговой, особо опасной
- Б) сапронозной, микотической
- В) антропонозной
- Г) вирусной

20. Для заражения гепатитом В и С наиболее значимыми субстратами являются

- А) кровь
- Б) моча
- В) сперма
- Г) слюна

21. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится

- А) 1 раз в сутки
- Б) 2 раза в сутки
- В) через день
- Г) 1 раз в неделю по графику

22. Минимальная продолжительность мытья рук после любой манипуляции

- А) 3-5 минут
- Б) 30-60 секунд
- В) 10-15 секунд
- Г) 15-20 секунд

23. Стерильный стол накрывают:

- А) на сутки
- Б) на 12 часов
- В) на 6 часов

24. Контроль качества предстерилизационной очистки на остатки крови проводится пробой

- А) бензидиновой
- Б) азопирамовой
- В) фенолфталеиновой
- Г) с суданом

25. При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора

- А) зеленое, переходящее в фиолетовое
- Б) фиолетовое, переходящее в розовое
- В) фиолетовое, переходящее в зеленое
- Г) синее, переходящее в зеленовато-красное

26. По масштабам чрезвычайная ситуация может быть

- А) биологическая
- Б) техногенная
- В) трансграничные
- Г) социально-политическая

27. По виду чрезвычайная ситуация может быть

- А) федеральная
- Б) местная
- В) техногенная
- Г) локальная

28. Первая сортировочная группа – это пораженные

- А) нуждающиеся в неотложной помощи на данном этапе
- Б) крайне тяжёлые поражения, агонирующие
- В) опасные для окружающих
- Г) легкопораженные

29. Для торпидной фазы травматического шока характерно

- А) возбуждение, АД повышено
- Б) снижение АД, тахикардия
- В) потеря сознания
- Г) холодный липкий пот, брадикардия

30. Синдром длительного сдавления (СДС) средней степени тяжести развивается у пострадавших при сдавливании (раздавливании) обширных участков мягких тканей в течении

- А) до 1 часа
- Б) до 1,5-2 часов
- В) 4-6 часов
- Г) 3-4 часов

31. При остановке артериального кровотечения из сонной артерии последнюю прижимают к

- А) остистому отростку 6 шейного позвонка

- Б) поперечному отростку 4 шейного позвонка
- В) поперечному отростку 6 шейного позвонка
- Г) телу 6 шейного позвонка

32. На ожоговую рану при оказании доврачебной помощи накладывают

- А) повязку с левомиколем
- Б) повязку с кожным антисептиком
- В) сухую стерильную контурную повязку
- Г) ожоговую рану не закрывают повязкой

33. Причиной возникновения гипогликемического состояния является

- А) недостаточное введение инсулина
- Б) нарушение диеты
- В) усиленная физическая нагрузка или избыток инсулина
- Г) тяжелое инфекционное заболевание

34. Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями воздуха при СЛР, проводимой 1 реаниматором

- А) 1 вдох : 5 компрессий
- Б) 1-2 вдоха : 6-8 компрессий
- В) 2 вдоха : 30 компрессий
- Г) 2 вдоха : 12 компрессий

35. Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца

- А) освободить пострадавшего от действия тока
- Б) выполнить ИВЛ, непрямой массаж сердца
- В) инъекция адреналина
- Г) дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи

36. Симптом Пастернацкого является характерным для

- А). почечной колики
- Б). острого аппендицита
- В). острого панкреатита
- Г). острого холецистита

37. Неотложная доврачебная помощь при отравлении кислотами

- А). беззондовое промывание желудка содовым раствором
- Б). зондовое промывание желудка содовым раствором
- В). зондовое промывание желудка раствором перманганата калия
- Г). беззондовое промывание желудка водой, дача адсорбентов, госпитализация

38. Приобретенный естественный активный иммунитет организм вырабатывает в результате

- А) введения вакцины
- Б) перенесения инфекционного заболевания в типичной форме, бактерионосительства
- В) бактериемии
- Г) после рождения

39. Холодовая цепь (cold chain) - система, включающая

- А) систему холодильного оборудования и расположенные в нем вакцины
- Б) специально подготовленный персонал и систему холодильного оборудования
- В) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима
- Г) система мероприятий, обеспечивающих соблюдение температурного режима при хранении

40. Поствакцинальная реакция - это

- А) нарушение правил асептики при введении вакцин
- Б) нормальная физиологическая реакция после иммунизации
- В) нарушение хранения вакцин
- Г) патологическая и индивидуальная реакция на введение вакцин

41. Наиболее часто микобактерии туберкулеза поступают в организм через

- А) желудочно-кишечный тракт
- Б) верхние дыхательные пути
- В) раны

42. Укажите интервал между прививкой и последующим плановым введением иммуноглобулина

- А) 1 месяц
- Б) 2 недели
- В) 3 месяца

43. Каков допустимый интервал между введением иммуноглобулина по эпидемическим показаниям и последующей профилактической прививкой против кори

- А) 6 месяцев
- Б) 1 месяц
- В) 3 месяца

44. С какого возраста проводится иммунизация против клещевого энцефалита отечественными вакцинами?

- А) с 4 лет
- Б) с 13 лет
- В) с 18 лет

45. Коревая вакцина содержит

- А) инактивированный вирус кори
- Б) живой вирус кори
- В) живой вакцинный штамм вируса кори
- Г) инактивированный вакцинный штамм вируса кори

46. Вакцина против краснухи содержит

- А) живой вирус краснухи

- Б) инактивированный вирус краснухи
- В) живой аттенуированный вирус краснухи (вакцинный штамм)
- Г) инактивированный вакцинный штамм вируса краснухи

47. Женщина, привитая против краснухи, должна быть предупреждена, что ей следует избегать беременности в течение

- А) 1 мес после прививки
- Б) 2 мес после прививки
- В) 3 мес после прививки
- Г) 6 мес после прививки

48. Профилактические медицинские осмотры являются основой

- А)первично медико-санитарной помощи
- Б)диспансерного наблюдения
- В)реабилитационной работы
- Г)экспертизы трудоспособности

49. Дефицит пульса возникает при

- А)тахикардии
- Б)падении АД
- В)мерцательной аритмии
- Г)повышении АД

50. Ятрогения- болезненное состояние, возникающее в результате неправильного:

- А) поведения медицинского работника в отношении пациента
- Б) ухода за пациентом с психическими расстройствами
- В) медикаментозного лечения психических расстройств
- Г) определения диагноза психического расстройства

51. При лечении хронического гастрита с сохраненной секрецией применяют

- А)альмагель, викалин
- Б)баралгин, аллохол
- В)левомицетин, колибактерин
- Г)плантаглюцид, фестал

52. При хроническом гастрите с сохраненной секрецией назначают диету

- А)№1
- Б)№2
- В)№3
- Г)№4

53. При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью рекомендуют ферментные препараты

- А)фестал
- Б)баралгин
- В)бисептол

Г)викалин

54. Признаки, характерные только для желудочного кровотечения

- А)бледность, слабость
- Б)головная боль, головокружение
- В)рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
- Г)тахикардия, гипотензия

55. Наиболее информативный метод диагностики заболеваний желудка

- А)желудочное зондирование
- Б)дуоденальное зондирование
- В)ультразвуковое исследование
- Г)эндоскопическое исследование

56.Ирригоскопия — это исследование

- А)рентгенологическое
- Б)рентгенологическое контрастное
- В)ультразвуковое
- Г)эндоскопическое

57. Нитропрепараты начинают действовать через:

- А) 30 секунд
- Б) 3-5 минут
- В)15 минут
- Г) 30 минут

58.При лечении хронического гепатита применяют препараты

- А)антибиотики
- Б)гепатопротекторы
- В)антигистаминные
- Г)нитрофураны

59. К мужским половым гормонам относятся

- А) эстрадиол
- Б) тестостерон
- В) прогестерон
- Г) паратгормон

60. Гормоном беременности называют:

- А) вазопрессин
- Б) пролактин
- В) прогестерон
- Г) паратгормон

61. К глюкокортикоидам относится гормон

- А) альдостерон
- Б) кортизон
- В) эстрадиол
- Г) паратгормон

62.Какая железа вырабатывает окситоцин

- А) гипоталамус
- Б) гипофиз
- В) надпочечники
- Г) шишковидное тело

63.Какая железа регулирует поступление окситоцина и вазопрессина в организм

- А) гипофиз
- Б) гипоталамус
- В) эпифиз
- Г) яичко

64.Гормон роста, вырабатываемый в гипофизе

- А) соматотропный гормон
- Б) глюкагон
- В) вазопрессин
- Г) паратгормон

65. Характерные симптомы острой дыхательной недостаточности(ОДН):

- А)одышка, кашель, цианоз кожи, повышение А/Д, повышение ЦВД
- Б)боли в животе, головокружения, похолодание конечностей, цианоз кожи
- В)боли в области сердца, одышка , головная боль , перебои в работе сердца
- Г)головная боль, потемнение в глазах, кашель с гнойной мокротой

66. Мерцательная аритмия- это

- А)затруднение прохождения импульса от предсердий к желудочкам
- Б)урежение ЧСС до 40 ударов в минуту
- В)хаотичные, быстрые некоординированные между собой фибрилляции отдельных участков сердечной мышцы

67.Нормальный уровень холестерина в крови

- А)2,8 ммоль/л
- Б)4,0 ммоль/л
- В)5,2 ммоль/л
- Г) 6,9 ммоль/л

68. Возможные факторы риска при гипертонической болезни

- А)гиповитаминоз
- Б)очаг хронической инфекции
- В)нервно-психическое перенапряжение
- Г)переохлаждение

69.Загрудинная боль, иррадирующая боль под левую лопатку, продолжительностью от 5-10 минут наблюдается при

- А)инфаркте миокарда
- Б)ревмокардите
- В)остеохондрозе
- Г)стенокардии

70.При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод

- А)зеленый
- Б)желтый

- В)красный
- Г)черный

71. Обморок-это форма острой недостаточности

- А)коронарной
- Б)левожелудочковой
- В)правожелудочковой
- Г) сосудистой

72. Частота сердечных сокращений 54 уд/мин. это-

- А)брадикардия
- Б)тахикардия
- В)экстрасистолия
- Г)норма

73.Основной симптом миастении

- А) судороги
- Б) мышечная утомляемость
- В) головная боль
- Г) тремор кистей

74. Для болезни Паркинсона характерно

- А) умственная деградация
- Б) нарушение координации
- В)тремор кистей
- Г) параличи конечностей

75.При геморрагическом инсульте необходимо

- А) придать больному положение с опущенным головным концом
- Б) приложить на голову пузырь со льдом
- В) повернуть больного на бок
- Г) придать больному полусидячее положение

76 .Нарастающие, упорные головные боли распирающего характера и явления застоя на глазном дне характерны для

- А) энцефалита
- Б) менингита
- В) опухоли головного мозга
- Г) рассеянного склероза

77.Характерный признак невралгии тройничного нерва

- А) рвота
- Б) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей
- В) приступообразные боли в одной половине лица
- Г) ригидность затылочных мышц

78. Отоскопия — это осмотр

- А) глотки
- Б) уха
- В) гортани
- Г) носа

79. Фарингоскопия — это осмотр

- А) глотки
- Б) носа
- В) уха
- Г) гортани

80. Непрямая ларингоскопия — это осмотр

- А) гортани
- Б) уха
- В) глотки
- Г) носа

81. Риноскопия — это осмотр

- А) уха
- Б) глотки
- В) гортани
- Г) носа

82. Острый отит — это воспаление

- А) среднего уха
- Б) небных миндалин
- В) слизистой носа
- Г) слизистой глотки

83. К осложнениям при попадании инородных тел в гортань относится

- А) пневмония
- Б) носовое кровотечение
- В) аносмия
- Г) воспаление среднего уха

84. Мазок из зева берут, чтобы исключить

- А) дифтерию
- Б) сифилис
- В) туберкулез
- Г) сальмонеллез

85. Ведущий клинический симптом бешенства

- А) водобоязнь
- Б) головные боли
- В) лихорадка
- Г) судороги жевательных мышц

86. Источник инфекции при роже

- А) больной человек и бактерионоситель
- Б) больные сельскохозяйственные животные
- В) грызуны
- Г) дикие животные

87. Доза, достаточная для заражения ВИЧ инфекцией содержится в

- А) секрете потовых желез
- Б) вагинальном секрете
- В) слюне

Г)моче

88. Продолжительность инкубационного периода при ВИЧ-инфекции в среднем

- А)3-8 недель
- Б)4-12 мес.
- В) до 3 лет
- Г)до 10 лет

89. Врачебную тайну составляет информация

- А) о диагнозе и лечении
- Б) об обращении и заболевании
- В) о прогнозе и исходе болезни
- Г) все выше перечисленное

90. Один из родителей может находиться в больнице с ребенком в течение

- А) 3-х дней
- Б) не более 15-ти дней
- В) не более 1-го месяца
- Г) всего времени пребывания

91. При заболеваниях, опасных для окружающих, медицинское вмешательство без согласия гражданина или его представителя:

- А) допускается
- Б) не допускается

92. Сестринское обследование при заболеваниях, передающимися половым путем

- А)сбор субъективной информации
- Б)бимонуальное обследование
- В)рентгенологическое исследование
- Г)исследование мочи

93. Паллиативная медицина оказывает помощь при:

- А) детских болезнях
- Б) острых болезнях
- В) неизлечимых заболеваниях
- Г) болезнях пожилых и стариков

94. Специальное учреждение, в котором оказывается паллиативная помощь:

- А) поликлиника
- Б) стационар
- В) хоспис
- Г) диспансер

95.Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал в процессе профессиональной деятельности, называется:

- А) инфекции связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
- Б) карантинным
- В) особо опасным
- Г) конвекционным

96. Уничтожение вегетативных и споровых форм микроорганизмов называется:

- А) дератизация
- Б) дезинфекция
- В) стерилизация
- Г) дезинсекция

97. Все отходы медицинской организации по степени опасности делятся на:

- А) 2 класса
- Б) 3 класса
- В) 4 класса
- Г) 5 классов

98. Текущая уборка в процедурном кабинете проводится:

- А) 1 раз в сутки
- Б) 2 раза в сутки
- В) 1 раз в 14 дней
- Г) 2 раза в 14 дней

99. 95% пациентов в хосписе составляет:

- А) больные раком
- Б) престарелые и старые люди
- В) разные больные
- Г) неврологические больные

100. Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе:

- А). возвышенный головной конец, прием анальгетиков;
- Б). опустить головной конец, тепло к ногам;
- В). опустить головной конец, прием гипотензивных средств;
- Г). возвышенный головной конец, прием гипотензивных средств.